

# 中干しにより適切な穂数へ誘導を!!

## 1. 溝掘りが中干しの効果を高める。

～中干しの前に秋まで残る溝を掘りましょう!!～

### 溝掘りの効果

- ・ 素早い排水ができ、中干しを均一に行なえる。
- ・ 間断かん水や出穂後の入排水管理も容易になる。
- ・ 田面の温度ムラが少なくなり、生育が安定する。

### 溝掘り作業の留意点

- ・ 溝掘り前に軽く田干ししましょう。
- ・ 溝は15条に1本以上設置しましょう。
- ・ ほ場の水溜まりが溝に流れるよう工夫しましょう。
- ・ 溝は必ず水尻に連結しましょう。



溝や水尻を  
しっかり連結



## 2. 中干しは、田植えの1ヶ月後を目安に、遅れずに!!

～適期中干しで異常気象にも負けない丈夫な茎をつくりましょう!!～

### 中干しの効果

- ・ 土中への酸素供給や有害ガスを抜くことにより、根の活力を高める。
- ・ 無効分けつの抑制により、茎を充実させる。
- ・ 乳白米の発生を抑え、粒厚向上につながり、米の品質が向上する。
- ・ 収穫時の地耐力を確保する。

中干し・間断  
かん水の  
適切なほ場



根張りが  
良い



中干し・間断  
かん水の  
不十分なほ場



根張りが  
悪い

半湿田には足がしむ程度

乾田では弱いヒビが入っている



### 中干し実施時の留意点

- ・ 3～5日間、田面に小さな亀裂が入り、足が沈まない程度に干しましょう。
- ・ 中干し開始と同時に溝の手直しを行いましょう。
- ・ 砂壤土などでは、強い中干しは行わないように注意しましょう。

中干し終了後、「エスアイ加里特号」10 kg以上/10a 又は  
「エスアイ加里カリ投げくん」4 kg以上/10a (200g×20) を施用し、  
気象変動に負けない稲体をつくりましょう。

◎ 散布時期 6月20日～25日頃

# 雑草が残ったら、次のパターンで随時防除を!!

## パターン1 田植えから20日間たち、雑草が残っている場合

⇒除草には中期剤を用います

効果のある雑草	除草剤名	成分数	使用方法
ノビエ・広葉雑草 ・表層はく離等 (ノビエは3.5葉まで)	マメットSM1キロ粒剤	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1kg/10アール 散布します</li> <li>・使用は1回のみです</li> <li>・使用できる期間は田植後20~30日です</li> <li>・高温(30℃以上)が予想される場合の使用は避けてください</li> <li>・福岡地区では使用できません</li> </ul>
	ブイゴールSM1キロ粒剤	3	
	サンパンチ1キロ粒剤	4	
ノビエ・広葉雑草 (ノビエは3.5葉まで)	クサファイター1キロ粒剤	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1kg/10アール 散布します。</li> <li>・使用は各々1回のみです。</li> </ul>
ノビエ・広葉雑草 (ノビエは4葉まで)	アクシズMX1キロ粒剤	3	

## パターン2 田植えから1カ月後、中干しを始めたいが、雑草が残っている場合

⇒田干しの開始と合わせ、落水状態で散布する後期剤を用います

クサネム

効果のある雑草	除草剤名	成分数	使用方法
ノビエ・広葉雑草 (ノビエは5葉まで)	ワイドアタックSC	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10アール当り、薬1本(100m?)を水100?に希釈し散布します[1,000倍]</li> <li>・使用は2回までとします、さらにフォローアップ1キロ粒剤と合わせて2回までとします</li> </ul>
	クリンチャーバスME液剤	2	
広葉雑草	ハサグラン粒剤	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3~4kg/10アール 散布します</li> <li>・使用は1回のみです</li> </ul>
	ハサグラン液剤	1	
クサネム草丈40cmまで イホクサ茎長30cmまで	ミニー液剤	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10アール当り、薬1本(100m?)を水100?に希釈し散布します[1,000倍]</li> <li>・使用は1回のみです</li> </ul>

## パターン3 中干しを終え入水したいが、雑草が残っている場合

⇒除草には、湛水状態で散布する後期剤を用います

効果のある雑草	除草剤名	成分数	使用方法
ノビエ (4葉まで)	ヒエクリーン豆つぶ250	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・250g/10アール 散布します</li> <li>・畦畔から散布可能です</li> <li>・使用は1回のみです</li> </ul>
ノビエ (5葉まで)	クリンチャー1キロ粒剤	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1.5kg/10アール 散布します</li> <li>・使用は2回までとします、さらにクリンチャーバスME液剤と合わせて3回までとします</li> </ul>
ノビエ・広葉雑草 (ノビエは5葉まで)	フォローアップ1キロ粒剤	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1kg/10アール 散布します</li> <li>・使用は1回のみです</li> </ul>

### [ 除草剤使用の注意点 ]

- 湛水状態で散布する剤
  - ・5cm程度の深水で散布します。
  - ・散布から5日間以上湛水を保ち、7日間は落水を避けます
- 落水状態で散布する剤
  - ・散布から3~4日間は入水を行わず、降雨があっても落水は行いません

※除草剤は使用できる期間が定まっています。ラベル内容をよく読みご使用ください。