

1. 現在の生育状況

- ・播種後に気温が高く降雨が少なかったことから、苗立は概ね良好。
- ・草丈は昨年よりやや長め、茎数は多め、全体として順調に生育しています。

○5月27日現在の生育状況(コシヒカリ:鉄コーティング含む)

	播種日	苗立数 (本/m ²)	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉齢 (L)
H28	5/6	66	15.5	86	3.3
H27	5/5	74	14.3	78	3.0
近年	5/3	64	15.7	75	3.2

※近年値は平成15~27年の平均値。

2. 当面の管理のポイント

(1) 「浅水管理」

○6月上旬までは、3cm程度の浅水管理により分けつの発生を促進する。

近年、直播ほ場で、紋枯病が多発しています。

(2) 「溝掘り ⇒ 中干し ⇒ オリブライト施薬」

① **溝掘りは6月上旬までに行い**、10~15条に1本程度作溝を行う。

また、中干し開始前に水吐尻としっかり連結するなど、溝を手直しする。
 (移植と同様に実施してください。)

② **6/10~15頃(茎数100本/m位)、遅れずに中干しを開始**しましょう。

③ 中干し終了後、**オリブライト1キロ粒剤等を散布**する。

◎水管理と肥培管理

月	6月上旬		6月10日頃	下旬	7月
水管理	浅水管理	溝掘り	浅水管理	中干し	中干し後の間断かん水
肥培管理					↑ ○オリブライトの散布 ○エスアイ加里の施用

(3) 「紋枯病・いもち病の防除」

6月20日頃に、『オリブライト 250G(豆つぶ剤)』または『オリブライト1キロ粒剤』を散布して、紋枯病・いもち病の防除を行う。

※水深5cm程度に入水し、散布後4~5日程度湛水状態を保ち、7日間は落水しない。

裏面へ続く

(4) 「雑草防除」

草が残っている場合は、草種に応じた除草剤を遅れないように散布しましょう。

	主な雑草	薬剤名 (農薬成分数)	10a 使用量及び希釈水量 (使用回数)	使用時期 等	
中期剤	ノビエ・広葉	アクシズMX 1キロ粒剤 (3)	1 kg (本剤のみは1回)	1 葉期～2 葉期まで 収穫 45 日前までに使用	
		サンパンチ 1キロ粒剤 (4)	1 kg (本剤のみは1回)	1 葉期～3.5 葉期まで 収穫 60 日前までに使用	
後期	ノビエのみ	クリンチャー 1キロ粒剤 (1)	1.0kg (本剤のみは2回)	【1.0 kg/10a 散布の場合】 播種後 10 日～2 葉期まで 収穫 30 日前までに使用	
			1.5kg (本剤のみは2回)	【1.5 kg/10a 散布の場合】 播種後 25 日～3.5 葉期まで 収穫 30 日前までに使用	
中期剤	ノビエ以外の広葉雑草	バサグラン粒剤 (1)	3～4kg (本剤のみは1回)	1 葉期～入水 50 日後まで 収穫 60 日前まで	
		【散布時の注意】 落水して散布し、3～4 日間は入水や落水をしない。			
		バサグラン液剤 (1)	液剤 500～700ml を 水で 70～100リットルに希釈 (本剤のみは2回)	播種後 35～50 日 収穫 50 日前までに使用	
【散布時の注意】 落水して散布し、3～4 日間は入水や落水をしない。					
後期	ノビエ・広葉雑草の両方	クリンチャー バス ME 液剤 (2)	液剤 1,000ml を 水で 70～100リットルに希釈 (本剤のみは2回)	播種後 10 日～3 葉期まで 収穫 50 日前までに使用	
		【散布時の注意】 落水して散布し、3～4 日間は入水や落水をしない。			
		ワイドアタック SC (1)	水和剤 100ml を 水で 100リットルに希釈 (本剤のみは2回)	4 葉期以降、5 葉期まで 収穫 30 日前までに使用。	
【散布時の注意】 落水して散布し、3～4 日間は入水や落水をしない。					

※除草剤の使用にあたっては、水稻直播栽培に登録のある剤を選び、「使用時期」、「使用量」、「使用回数」、「使用上の注意」など、使用基準を必ず守ってください。

※上記の中期剤およびクリンチャー1キロ粒剤の散布に際し、散布時は 5 cm 程度の深水とし、散布後 7 日間は湛水状態を保ちましょう。