

1. 現在の生育状況

- ・播種後、気温が高く推移し、降雨が少なかったことから、苗立は概ね良好。
- ・5月上旬に播種したカルパ-直播では、近年に比べ、草丈は長く、茎数は多め、葉齢の進みも早くなっている。
- ・鉄コーティング直播の播種時期が遅いほ場でも、生育量は確保されつつある。

5月29日現在の生育状況例(コシヒカリ、メルヘン展示ほ、1ほ場ずつ)

	播種日	苗立数 (本/m ²)	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉齢 (L)
H29カルパ-	5/6	66	19.1	86	3.7
H29鉄コ	5/12	66	9.6	66	2.4
近年カルパ-	5/3	63	15.7	73	3.0
近年鉄コ	5/7	66	11.2	74	2.5

※近年カルパ-は、H19~28の平均。近年鉄コは、H24~28の平均。

2. 当面の管理のポイント

(1) 「浅水管理」

- 3cm程度の浅水管理により、軟弱徒長を防ぎ、分げつの発生を促進する。


(2) 「溝掘り・中干し」

- 溝掘りは6月上旬までに行い**、10~15条に1本程度作溝を行う。
また、中干し開始前に水吐尻としっかり連結するなど、溝を手直しする。
- 6/10頃(茎数100本/m位)、遅れずに中干しを開始**しましょう。

(3) 「紋枯病・いもち病の防除」

- 中干し終了後、**7月上旬に、オリブライト剤を散布**する。
- 紋枯病対策強化のため、7月上旬に、『オリブライト 250G(豆つぶ剤)』または『オリブライト1キロ粒剤』を散布して、紋枯病・いもち病の防除を行う。
※水深5cm程度とし、散布後4~5日程度湛水状態を保ち、7日間は落水しない。

◎水管理と肥培管理の目安



(4) 「雑草防除」

雑草が残っている場合は、草種に応じた除草剤を遅れないように散布しましょう。

	適用雑草	薬剤名 (農薬成分数)	10a 当使用量・希釈水量 (使用回数)	使用時期	
中期剤	ノビエ・広葉	アクシズMX 1キロ粒剤 (3)	1 kg (本剤のみは1回)	1 葉期～2 葉期まで 収穫 45 日前までに使用	
		ブイゴールSM 1キロ粒剤 (3)	1 kg (本剤のみは1回)	1 葉期～3 葉期まで 収穫 60 日前までに使用	
後期	ノビエのみ	クリンチャー 1キロ粒剤 (1) *ジヤポ剤や液剤も あります。	1.0kg (本剤のみは2回)	【1.0 kg/10a 散布の場合】 播種後 10 日～2 葉期まで 収穫 30 日前までに使用	
			1.5kg (本剤のみは2回)	【1.5 kg/10a 散布の場合】 播種後 25 日～2 葉期まで 収穫 30 日前までに使用	
中期剤	ノビエ以外の広葉雑草	バサグラン粒剤 (1)	3kg (本剤のみは1回)	1 葉期～入水 50 日後まで 収穫 60 日前まで	
		【散布時の注意】 落水して散布し、3～4 日間は入水や落水をしない。			
		バサグラン液剤 (1)	液剤 500～700ml を 水で 70～100リットルに希釈 (本剤のみは2回)	播種後 35～50 日 収穫 50 日前までに使用	
【散布時の注意】 落水して散布し、3～4 日間は入水や落水をしない。					
後期	ノビエ・広葉雑草の両方	クリンチャー バス ME 液剤 (2)	液剤 1,000ml を 水で 70～100リットルに希釈 (本剤のみは2回)	播種後 10 日～2 葉期まで 収穫 50 日前までに使用	
		【散布時の注意】 落水して散布し、3～4 日間は入水や落水をしない。			
		ワイドアタック SC (1)	水和剤 100ml を 水で 100 リットルに希釈 (本剤のみは2回)	1 葉期以降、2 葉期まで 収穫 30 日前までに使用。	
【散布時の注意】 落水して散布し、3～4 日間は入水や落水をしない。					

※除草剤の使用にあたっては、水稻直播栽培に登録のある剤を選び、「適用雑草」、「使用時期」、「使用量」、「使用回数」、「使用上の注意」など、使用基準を必ず守ってください。

※上記の中期剤およびクリンチャー1キロ粒剤の散布に際し、散布時は 5 cm 程度の深水とし、散布後 7 日間は湛水状態を保ちましょう。